

מטופלות נכבדות

בהדיקת שצברת נמצא בקיבתך החיידק הליקובקטר פילורי.
חיידק זה מהווה את אחד הארמים הציקריים לכיב קיבה או תריסרון
ומקרים נדירים ביותר עלולים לגרום לסרטן קיבה.
חיידק זה נפוץ בכ-50% מהאוכלוסייה בארץ ובעולם.

לאור עמידותו הגבוהה של החיידק מומלץ טיפול משולב של מס תרופות.
הקפדה על הוראות הטיפול מצליחה לחסל את החיידק במעל מ-90% מהמקרים.

הטיפול הניבחר עבור אנשים שלא טופלו מעולם הוא:

סוג התרופה	בקר	ערב
נקסיום 40 מ"ג	1	1
מוקסיפן 500 מ"ג	2	2
קלסיד/קלרידקס/קלריטרומיצין 500 מ"ג	1	1
פרוטוציד/טינידזול 500 מ"ג	1	1

מומלץ לקחת את הטיפול עם הארוחה.
להצלחת הטיפול יש להקפיד לקחת את הטיפול במלואו- במשך 14 ימים

הטיפול הניבחר עבור רגישים לפנצילין: ("טיפול מרובע קלאסי")

סוג התרופה	בקר	ערב
נקסיום 40 מ"ג	1	1
ביסמוט (קל בטן פורטה)	1	1
דוקסילין 100 מ"ג	1	1
פרוטוציד/טינידזול 500 מ"ג	1	1

להצלחת הטיפול יש להקפיד לקחת את הטיפול במלואו- במשך 14 ימים

אם טופלת בעבר לחיידק ב"טיפול משולש":

יש לקחת את הטיפול השני (ה"טיפול המרובע": נקסיום/קל בטן פורטה/דוקסילין/פרוטוציד) או טיפול ב:

סוג התרופה	בקר	ערב
נקסיום 40 מ"ג	1	1
מוקסיפן 500 מ"ג	2	2
לבופלוקסצין (טאבניק) 500 מ"ג	1	1

להצלחת הטיפול יש להקפיד לקחת את הטיפול במלואו- במשך 10 ימים

- רופא המשפחה, יודע כמובן את פרטוקולי הטיפול, אך לאור השינויים בעמידות החיידק לטיפול האנטיביוטי ובהמלצות המעודכנות, אני מציע להביא לידיעתו מסמך זה.
- מומלץ לוודא את חיסול החיידק ע"י מבחן נשימה 4 שבועות לאחר סיום הטיפול האנטיביוטי.

בהצלחה,
ד"ר שחר איל